

## Situación de los rodeos de cría bovina en la Cuenca del Salado. Septiembre 2020.

### Introducción


La situación ganadera de la Cuenca del Salado es monitoreada por el INTA en varios establecimientos de cría bovina desde el año 2004 a la fecha. En el presente informe se detallan los resultados obtenidos durante el mes de septiembre de 2020. Los campos monitoreados corresponden a 14 partidos: **Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Lezama, Gral. Belgrano, Pila, Ayacucho, Rauch, Tapalqué, Saladillo, Las Flores, Dolores, Gral. Guido y Gral. Madariaga.** Los principales parámetros evaluados fueron estado corporal, mortalidad de vientres y porcentaje de parición. El estado corporal se realiza mediante apreciación visual utilizando un patrón preestablecido con una escala 1 a 5 (1: flaca y 5: gorda).

<b>Cuadro 1.</b>				
Campos	Sup. prom.	Vacas	Preñez	Paridas al 14/9
46	615 has	13207	85,8%	47,7%




## Resultados

En el gráfico 1 se presenta la evolución del estado corporal promedio al parto en los últimos 16 años (escala 1 a 5).




En el gráfico 2 se observa la proporción de vacas observadas en cada punto de la escala de estado corporal durante los últimos 16 años. Para el presente año se observó un 44% de vientres con estado corporal inferior al óptimo (EC=3), con un 39% de vacas en estado 2,5 y un 5% en estado inferior a 2,5.



En el gráfico 3 se observa el porcentaje de mortandad de vientres durante el periodo abril - agosto en los últimos 16 años. Durante este invierno, la

mortandad fue del 1,1%, y estuvo por debajo de la registrada en los últimos años.



## Comentarios

- Se observó un estado corporal regular de los vientres al inicio de la parición, lo cual sumado a la perspectiva de un inicio de primavera con bajas precipitaciones pone en situación de alerta a los rodeos de cría frente al próximo servicio. Se recomienda realizar un monitoreo permanente del estado corporal y diagnóstico de la actividad reproductiva. En rodeos con situaciones críticas se deberán realizar tratamientos reproductivos como el destete temporario, inducción de celo o destete precoz para evitar bajos índices de preñez y retraso en la distribución de las preñeces.
- Las bajas precipitaciones durante el invierno estuvieron asociadas a menor porcentaje de mortandad de vientres que los que se registraron en los últimos años.
- Las pérdidas de terneros en el peri-parto generalmente se reducen en los inviernos secos, por lo que se espera que el índice de destete mejore en este sentido.


## Agradecimientos

A todos los productores ganaderos, asesores y empleados que forman parte del monitoreo de cría bovina en el área de influencia de la EEA Cuenca del Salado. Al Ing. Agr. Daniel Coria (MAI - Dolores), y a los médicos veterinarios Ruben Livio (Tapalqué) y Claudio Franchino (Rauch) por su colaboración. A los

técnicos Med. Vet. Sergio Weiss y Lic. Pedro Ezcurdia de la EEA INTA Cuenca del Salado.

**Para mayor información**

Méd. Vet. Plorutti Federico [plorutti.federico@inta.gob.ar](mailto:plorutti.federico@inta.gob.ar)



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación



**Buenos Aires**  
Provincia